

Amoxicillin Treatment 阿莫西林治疗

阿莫西林 (Amoxicillin) 属于抗生素，经口服用于治疗性病。

过敏 Allergies

- 如果你对任何青霉素类抗生素 (penicillin antibiotic) 过敏，如：阿莫西林 (Amoxicillin)、青霉素 V-K (Penicillin-V-K)，含有或任何头孢菌素类抗生素 (cephalosporin antibiotic)，如：头孢克肟 (Cefixime 或 Suprax[®])、头孢氨苄 (Cephalexin)、头孢克洛 (Cefaclor) 等，请告诉医护人员。

怀孕或哺乳期间 Pregnancy/Breastfeeding

- 在怀孕期和哺乳期，可用阿莫西林。请向医生咨询。

注意事项 CAUTION

- 请在服用最后一剂阿莫西林和口服伤寒疫苗 (Typhoid Vaccine，如：Vivotif[®]) 之间，间隔 24 小时或以上。
- 请注意，本文未列出静脉药物。如果你在用此类药物，请通知医护人员。

如果你正在服用以下药物，请告诉医生：

Tell your doctor if you are taking the following medications:

- 抗凝血剂 (Anticoagulants)：Warfarin (Coumadin[®])
- 抗抑郁药 (Antidepressant) 药或抗焦虑 (Anxiolytic)：Venlafaxine (Effexor[®] XR)
- 避孕药 (雌性激素类 <Estrogens>，或孕激素类 <Progestogens>)
- 痛风药 (Gout) 或痛风性关节炎药 (Gouty Arthritis)：Probenecid (Benuryl[®])
- 免疫抑制剂 (Immunosuppressant)：Methotrexate (Rheumatrex[®])

副作用 Side Effects

- 你可能会出现腹泻、恶心、腹痛或呕吐等症状。
- 如果你出现以下过敏反应症状，如：荨麻疹、呼吸困难，脸部、嘴唇、舌头和喉咙肿胀，请即时寻求紧急医疗援助。

服药说明 Instructions for Taking

- 一次服用一粒胶囊 (500 毫克)，每日三次，可与或不与食物同服，直到服完为止。
- 如果漏服一剂药，在你记起时尽快补服，但是如果已几乎快到服下一剂药的时间，则无需再补服漏服的那一剂药，请勿服用双倍的剂量。

Amoxicillin Treatment (cont'd)

阿莫西林治疗 (续前页)

贮藏说明 Storage Instructions

- 存于 15-30°C 之间的室温。
- 避光、防热、防潮。
- 不要服用过期的药物。
- 避免儿童触及。

特别说明 Special Instructions

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天疗程后的一周，或
 - 完成七天的疗程，以及
 - 即使你的性伴侣（们）检测结果呈阴性，该伴侣（这些伴侣）也已接受了治疗。
- 如果有以下情况，请告诉医护人员：
 - 你与未接受治疗的伴侣（们）有性生活，或
 - 在你或你的性伴侣（们）完成治疗之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷尔蒙避孕方式（口服避孕药、上环或避孕贴片），另请再用非荷尔蒙避孕方式（例如：安全套或避孕膜），直到你现在的周期结束。

在完成治疗疗程之后的 3-4 周，应检测衣原体（Chlamydia）的治愈情况。

如果你有任何疑问或需要更多的信息，请联系医生、当地的医疗机构，或请参阅下面的联系方式。