

Amoxicillin Treatment 阿莫西林治療

阿莫西林 (Amoxicillin) 屬於抗生素，經口服用於治療性病。

過敏 Allergies

- 如果你對任何青黴素類抗生素 (penicillin antibiotic) 過敏，如：阿莫西林 (Amoxicillin)、青黴素 V-K (Penicillin-V-K)，含有或任何頭孢菌素類抗生素 (cephalosporin antibiotic)，如：頭孢克肟 (Cefixime 或 Suprax[®])、頭孢氨苄 (Cephalexin)、頭孢克洛 (Cefaclor) 等，請告訴醫護人員。

懷孕或哺乳期間 Pregnancy/Breastfeeding

- 在懷孕期和哺乳期間，可服用阿莫西林。請向醫生諮詢。

注意事項 CAUTION

- 在服用最後一劑阿莫西林和口服傷寒疫苗 (Typhoid Vaccine 如 Vivotif[®]) 之間，請間隔 24 小時或以上。
- 請注意。本文未列出透過靜脈用藥。如果你正在使用此類藥物，請通知醫護人員。

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell your doctor if you are taking the following medications:

- 抗凝血劑 (Anticoagulants) : Warfarin (Coumadin[®])
- 抗抑鬱藥 (Antidepressant) 或抗焦慮藥 (Anxiolytic) : Venlafaxine (Effexor[®] XR)
- 避孕藥 (雌激素 <Estrogens>, 或黃體素 <Progestogens>)
- 痛風藥 (Gout) 或痛風性關節炎藥 (Gouty Arthritis) : Probenecid (Benuryl[®])
- 免疫抑制劑 (Immunosuppressant) : Methotrexate (Rheumatrex[®])

副作用 Side Effects

- 你可能會出現腹瀉、惡心、腹痛、嘔吐等徵狀。
- 如果你出現以下過敏反應徵狀，如：蕁麻疹、呼吸困難、臉部、嘴唇、舌頭和喉嚨腫脹，請即時尋求緊急醫療援助。

服藥說明 Instructions for Taking

- 一次服用一粒膠囊 (500 毫克)，每日三次，可空腹服藥或與食物同服，直到服完為止。
- 如果漏服一劑藥，請在你記起時盡快補服。但是如果已幾乎快到服下一劑藥的時間，則無需再補服漏服的那一劑藥，請勿服用雙倍的劑量。

Amoxicillin Treatment (cont'd)

阿莫西林治療（續前頁）

儲存說明 **Storage Instructions**

- 存於攝氏 15-30° 之間的室溫。
- 避光、防熱、防潮。
- 不要服用過期的藥物。
- 避免兒童觸及。

特別說明 **Special Instructions**

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天療程後的一週，或
 - 完成七天的療程，以及
 - 即使你的性伴侶（們）測試結果呈陰性，該伴侶（這些伴侶）也已接受了治療。
- 如果有以下情況，請告訴醫護人員：
 - 你與未接受治療的伴侶（們）有性生活，或
 - 在你或你的性伴侶（們）完成治療之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷爾蒙（口服避孕藥、子宮環或避孕貼片）方式避孕，另請再用非荷爾蒙避孕方式避孕（例如：安全套或避孕膜），直到你現在的週期結束。

在完成治療療程之後的 3-4 週，應檢測衣原體（Chlamydia）的治愈情況。

如果你有任何疑問或需要更多的信息，請聯絡醫生、本地的醫療機構，或參閱以下聯絡資料。