



Cefixime Treatment 头孢克肟治疗

头孢克肟（Cefixime 如 Suprax[®]）属于抗生素，经口服用于治疗性病。

过敏 Allergies

- 如果你对任何青霉素类抗生素（penicillin antibiotic）过敏，如：青霉素 V-K（Penicillin-V-K）、阿莫西林（Amoxicillin），或任何头孢菌素类抗生素（cephalosporin antibiotic），如：头孢克肟（Cefixime，如：Suprax[®]）、头孢氨苄（Cephalexin）、头孢克洛（Cefaclor）等，请告诉医护人员。

怀孕或哺乳期间 Pregnancy/Breastfeeding

- 在怀孕期，可慎用头孢克肟。请向医生咨询。
- 在哺乳期，应慎用头孢克肟，因为服用此药可能会导致胎儿变得过敏（allergic sensitization）。

注意事项 CAUTION

- 请在服用最后一剂头孢克肟和口服伤寒疫苗（Typhoid Vaccine 或 Vivotif[®]）之间，间隔 24 小时或以上。
- 请注意，本文未列出静脉药物。如果你在用此类药物，请通知医护人员。

如果你正在服用以下药物，请告诉医生

Tell your Doctor if you are taking the following medication

- 避孕药（雌性激素类<Estrogens>，或孕激素类<Progestogens>）
- 痛风药（Gout）或痛风性关节炎药（Gouty Arthritis）：Probenecid（Benuryl[®]）

副作用 Side Effects

- 你可能会出现腹泻、恶心、腹痛、头痛或眩晕等症状。
- 如果你在接受治疗后，出现任何反应（例如：荨麻疹、呼吸困难，脸部、嘴唇、舌头和喉咙肿胀），请即时寻求紧急医疗援助。

服药说明 Instructions for Taking

- 单剂药量包括数片药片，请同时服用。
- 头孢克肟可与食物同服，以减少胃部不适的机会。

贮藏说明 Storage Instructions

- 存于 15-30°C 之间的室温。
- 避光、防热、防潮。
- 不要服用过期的药物。
- 避免儿童触及。

Cefixime Treatment (cont'd)

头孢克肟治疗（续前页）

特别说明 **Special Instructions**

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天疗程后的一周，或
 - 完成七天的疗程，以及
 - 即使你的性伴侣（们）检测结果呈阴性，该伴侣（这些伴侣）也已接受了治疗。
- 如果有以下情况，请告诉医护人员：
 - 你与未接受治疗的伴侣（们）有性生活，或
 - 在你或你的性伴侣（们）完成治疗之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷尔蒙避孕方式（口服避孕药、上环或避孕贴片），另请再用非荷尔蒙避孕方式（例如：安全套或避孕膜），直到你现在的周期结束。

如果你有任何疑问或需要更多的信息，请联系医生、当地的医疗机构，或请参阅下面的联系方式。