

Medroxyprogesterone (Depo-Provera[®]) Treatment 甲羟孕酮 (Depo-Provera[®]) 治疗

甲羟孕酮 (Medroxyprogesterone 或 Depo-Provera[®]) 属于黄体酮的一种, 经肌肉注射用于避孕。

过敏 Allergies

- 如果你对 Provera[®] 或 medroxyprogesterone acetate (通用名称) 过敏, 请告诉医护人员。

怀孕或哺乳期间 Pregnancy/Breastfeeding

- 在怀孕期, 应忌用甲羟孕酮
- 在哺乳期, 可服用甲羟孕酮
- 在服用第一剂药之前, 请确定你未怀孕
- 在正常月经周期的首 5 天, 哺乳喂养孩子的妇女在产后 6 周或不哺乳喂养孩子的妇女在产后 5 天内开始服药。

注意事项 CAUTION

- 在服用 Depo-Provera[®] 时, 不可同时服用以下药物:
 - Aminoglutethimide (Cytadren[®])
- 当此药用作长期避孕药 (大于 2 年), 可导致增加骨矿物密度 (bone mineral density, BMD) 的流失。要定期测定骨矿物密度, 并确保你摄入充足的钙和维生素 D。
- 由于心脏病发作的风险增加, 故要忌烟。
- 如果你正在服用 Rifampin (Rifadin[®]), 请告诉医生。

副作用 Side Effects

- 你可能会出现月经不调 (停经、经期紊乱)、腹痛、体重改变、眩晕、头痛、乳房触痛或神经质等症状。

在接受治疗后的自我护理 Care of Yourself Following Treatment

- 接受治疗之后, 请在诊所多待 15 分钟。
- 接受治疗之后, 如果出现任何反应 (例如: 皮疹、瘙痒、呼吸困难等), 请立即告诉医护人员。
- 离开诊所之后, 如果出现这些症状, 请即时寻求紧急医疗援助。

Medroxyprogesterone (Depo-Provera[®]) Treatment (cont'd) 甲羟孕酮 (Depo-Provera[®]) 治疗 (续前页)

贮藏说明 Storage Instructions

- 存于 15-30°C 之间的室温。
- 避光、防热、防潮。
- 不要服用过期的药物。
- 避免儿童触及。

特别说明 Special Instructions

- 如果你改用另一种荷尔蒙避孕方式（口服避孕药、上环或避孕贴片），在上次使用的荷尔蒙避孕方式（口服避孕药、上环或避孕贴片）之后的 7 天开始用药。每次注射用药务必要恰好相隔 3 个月。
- 甲羟孕酮不能预防艾滋病病毒（HIV）或其他的性病。
- 如果首次用药是在正常月经周期的首 5 天内，该药在注射当天即产生药效。如果用药是在该周期稍后的时间内，该药可能可能需要 3-4 周后才生效，请增用另一种非荷尔蒙避孕方式（例如：安全套或避孕膜），直到你现在的周期结束。

如果你有任何疑问或需要更多的信息，请联系医生、当地的医疗机构，或请参阅下面的联系方式。