



Spectinomycin Treatment 奇霉素治疗

奇霉素 (Spectinomycin) 属于抗生素，经肌肉注射用于治疗性病。

过敏 Allergy

- 如果你对奇霉素(Spectinomycin)、氨基环醇 (aminocyclitol)、亚硫酸盐 (sulfite) 或苯甲醇 (benzyl alcohol) 等过敏，请告诉医护人员。

怀孕或哺乳期间 Pregnancy/Breast Feeding

- 在怀孕期和哺乳期，可慎用奇霉素。请向医生咨询。

注意事项 CAUTION

- 在服用奇霉素时，不可同时服用以下药物：
 - 口服伤寒疫苗 (Typhoid vaccine 如 Vivotif[®])
- 请注意，本文未列出静脉药物。如果你在用此类药物，请通知医护人员。

副作用 Side Effects

- 在注射点，你可能会感到不适感。也可能出现皮疹、眩晕、恶心、畏寒、发烧或头痛等症状。

在接受治疗后的自我护理 Care of Yourself Following Treatment

- 接受治疗之后，请在诊所多待 15 分钟。
- 接受治疗之后，如果出现任何反应 (例如：皮疹、瘙痒、呼吸困难等)，请立即告诉医护人员。
- 离开诊所之后，如果出现这些症状，请即时寻求紧急医疗援助。

贮藏说明 Storage Instructions

- 存于 15-30°C 之间的室温。
- 避光、防热、防潮。
- 不要服用过期的药物。
- 避免儿童触及。

特别说明 Special Instructions

- 忌性生活，直至：
 - 在完成一天治疗后的一周，或
 - 完成七天的治疗，以及
 - 即使你的性伴侣 (们) 检测结果呈阴性，该伴侣 (这些伴侣) 仍接受了治疗。
- 如果有以下情况，请告诉医护人员：
 - 你与未接受治疗的伴侣 (们) 有性生活，或
 - 在你或你的性伴侣 (们) 完成治疗之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷尔蒙避孕方式 (口服避孕药、上环或避孕贴片)，请另再用非荷尔蒙避孕方式 (例如：安全套或避孕膜)，直到你现在的周期结束。

如果你有任何疑问或需要更多的信息，请联系医生、当地的医疗机构，或请参阅下面的联系方式。