



Điều Trị bằng Spectinomycin (Spectinomycin Treatment)

Spectinomycin là thuốc trụ sinh tiêm bắp để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.

Các Chứng Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với Spectinomycin, aminocyclitol, sulfites hoặc benzyl alcohol.

Có Thai/Cho Con Bú Sữa Mẹ (Pregnancy/Breastfeeding)

- Nên thận trọng khi dùng **Spectinomycin** trong thời gian có thai và cho con bú sữa. Xin hỏi bác sĩ của quý vị.

THẬN TRỌNG (CAUTION)

- **Quý vị không thể dùng các loại thuốc sau đây với Spectinomycin:**
 - Thuốc Uống ngừa Thương Hàn (Vivotif®)
- **Xin lưu ý là các loại thuốc truyền qua tĩnh mạch không được liệt kê trong tài liệu này. Nếu quý vị có dùng bất cứ loại thuốc nào truyền qua tĩnh mạch, xin thông báo cho bác sĩ của quý vị.**

Các Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị đau tại chỗ chích và da nổi đỏ, chóng mặt, buồn nôn, ớn lạnh, sốt, hoặc nhức đầu.

Tự Chăm Sóc Sau Khi Điều Trị (Care of Yourself Following Treatment)

- Xin chờ trong phòng khám 15 phút sau khi điều trị.
- Nếu quý vị bị bất cứ phản ứng nào sau khi điều trị (thí dụ: da nổi đỏ, ngứa ngáy, khó thở), xin thông báo ngay cho nhân viên.
- Nếu các triệu chứng này xảy ra sau khi rời phòng khám, xin nhờ trợ giúp cấp cứu y tế ngay.

Chỉ Dẫn Cách cất Thuốc (Storage Instructions)

- Cất ở nhiệt độ trong phòng từ 15-30°C.
- Bảo vệ để thuốc không tiếp xúc với ánh sáng, hơi nóng, và ẩm ướt.
- Đừng dùng thuốc khi đã quá hạn in trên nhãn.
- Cất xa tầm với của trẻ em.

Chỉ Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình mà hãy chờ cho đến:
 - một tuần sau khi xong chương trình điều trị 1 ngày của quý vị; hoặc
 - chương trình điều trị 7 ngày của quý vị đã hoàn tất, và
 - (những) người bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, dù kết quả thử nghiệm của họ là không bị nhiễm.
- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu:
 - quý vị làm tình với một người bạn tình chưa được điều trị hoặc
 - quý vị làm tình trước khi hoàn tất chương trình điều trị của quý vị hoặc (những) người bạn tình của quý vị.
- Nếu quý vị đang dùng loại ngừa thai bằng kích thích tố (thuốc uống, vòng, hoặc miếng dán), hãy dùng thêm một phương pháp ngừa thai không bằng kích thích tố (chẳng hạn như bao cao su/màng chắn) cho đến khi dứt kinh kỳ hiện nay của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với bác sĩ, trạm y tế địa phương, hoặc xem chi tiết liên lạc dưới đây.